PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria

ZONA OPERATIVA DI OVADA

Bollettino di difesa guidata della vite n°12 del 23/07/2014

FASE FENOLOGICA: GRAPPOLO SERRATO / INIZIO INVAIATURA

PERONOSPORA

Perdurano condizioni climatiche anomale per il periodo estivo. Si registrano in numerosi areali la presenza di macchie su femminelle. Si consiglia di trattare con un prodotto a base di RAME. Trattare con cura entrambi i lati del filare. In caso di forti attacchi, intervenire con un prodotto endoterapico.

OIDIO

Addizionare al trattamento uno zolfo colloidale ai <u>massimi dosaggi</u> in etichetta.
Chi volesse una maggiore protezione utilizzare formulati a base di uno dei
Seguenti P.A.: QUINOXYFEN, METRAFENONE (max. 3 volte)
CYFLUFENAMID (max. 2 volte)

MUFFA GRIGIA

Intervenire sulla vegetazione operando una <u>sfogliatura moderata</u> per permettere un arieggiamento zona grappoli. Nei vigneti a maggior rischio addizionare antibotritico specifico.

FLAVESCENZA DORATA

In base alle indicazioni fornite dai rilievi in vigna, si prevede di effettuare il 2° trattamento negli ultimi giorni del mese. Seguira' apposito bollettino.

SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI AD ALMENO 48 ORE.

> Ufficio Consorzio 0143/835762 Coltivatori Diretti 0143/86268 Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083 Unione Agricoltori 0143/86307