

PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione del Regolamento PSR 214

**COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA DELLE COLTURE
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Corso IV Novembre 44-15100 Alessandria**

ZONA OPERATIVA DI OVADA

**Bollettino di difesa guidata della vite
n° 7 del 25/06/2014**

FASE FENOLOGICA: MIGNOLATURA / PRE- CHIUSURA

OIDIO

LE CONDIZIONI PERMANGONO FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DEL PATOGENO, SI CONSIGLIA
PERTANTO, APPENA LE CONDIZIONI METEO LO PERMETTERANNO, DI INTERVENIRE CON

ZOLFO IN POLVERE alla dose di 25-30 Kg/Ha.

Per chi adottasse una linea utilizzando dei prodotti a lunga persistenza, si consiglia di mantenere la vegetazione
coperta considerando il periodo di persistenza del principio attivo.

BOTRITE

Vista la fase fenologica si consiglia di intervenire con fungicidi contenenti: Pirimetanil*,
Mepanipirym*, Ciprodinil + Fludioxonil*, Fenexamide**, Boscalid***(1), Fluopyram***,
Trifloxystrobin****(1), Fluazinam.

* p.a. utilizzabili una sola volta all'anno complessivamente (qualsiasi sia il p.a. impiegato)

** p.a. impiegabile solo una volta all'anno

*** p.a. utilizzabili una sola volta all'anno IN ALTERNATIVA tra loro e indipendentemente
dall'avversità trattata.

**** p.a. utilizzabile al massimo tre volte all'anno indipendentemente dalle avversità;

(1)p.a. efficaci anche su OIDIO

Per ottenere una maggiore efficacia del prodotto prescelto, si consiglia di effettuare interventi agronomici
di sfogliatura della fascia grappolo.

**SI RICORDA CHE, AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEGLI OPERATORI, IL
TEMPO DI RIENTRO NEI VIGNETI DOPO I TRATTAMENTI E' PARI A 48 ORE.**

Ufficio Consorzio 0143/835762

Coltivatori Diretti 0143/86268

Confederazione Italiana Agricoltori 0143/835083

Unione Agricoltori 0143/86307