

# PIANO REGIONALE DI DIFESA INTEGRATA

Applicazione Regolamento CE 1234/07

COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGRATA  
DELLE COLTURE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA DI ACQUI TERME

Bollettino di difesa della vite n° 11 del 26/07/2016

**FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE - TRATTAMENTI INSETTICIDI OBBLIGATORI**

**Secondo trattamento: periodo 28 luglio – 3 agosto 2016**

## **STRATEGIA CONSIGLIATA**

*I viticoltori che hanno effettuato il primo trattamento con clorpirifos etile o etofenprox devono intervenire con*

**CON FORMULATI REGISTRATI A BASE DI**

**TIAMETOXAM o ACETAMIPRID**

**alle dosi di etichetta dei formulati commerciali**

**RISPETTANDO I TEMPI DI CARENZA**

**Per trattamenti in prossimità della**

**vendemmia (ad esempio per base**

**spumante) si consigliano trattamenti con**

**piretroidi registrati**

*I viticoltori che hanno effettuato il primo trattamento con tiametoxam o acetamiprid*

**NON DEVONO UTILIZZARE LA STESSA**

**SOSTANZA ATTIVA, ma alternare i prodotti**

**DOPO IL TRATTAMENTO E TRASCORSO IL TEMPO DI RIENTRO (ALMENO 48 ORE) ESTIRPARE LE PIANTE MALATE ED ELIMINARE I TRALCI CON SINTOMI PER TOGLIERE LA FONTE DI FITOPLASMA CHE RENDE INFETTIVO L'INSETTO VETTORE (SCAFOIDEO).**

### **Salvaguardia degli insetti pronubi (Legge regionale 3/8/98, n. 20)**

- Sfalcio e appassimento/asportazione della vegetazione sottostante nel caso di presenza di fioriture spontanee prima di eseguire i trattamenti insetticidi.
- NON trattare in luglio e agosto in presenza di melata di metcalfa; nel caso intervenire prima del trattamento insetticida con Sali Potassici come lavaggio della melata.
- Evitare fenomeni di deriva (non trattare in presenza di vento).

### **ACCORGIMENTI**

- Controllare il pH della soluzione in modo che sia inferiore a 7.
- Impiegare volumi di acqua e pressioni di distribuzione in grado di bagnare bene tutta la vegetazione;
- Trattare tutti i filari da entrambi i lati.
- Cercare di far arrivare la soluzione sulla pagina inferiore delle foglie, comprese quelle dei polloni.
- Evitare presenza di polloni o erbe infestanti troppo sviluppate alla base dei ceppi.