

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 6 del 03.06.2026

Fase fenologica prevalente: **Allegagione**

PERONOSPORA

Trattare

La sensibilità della vegetazione alla malattia, le condizioni climatiche predisponenti lo sviluppo dei funghi e le previsioni di pioggia che caratterizzano i prossimi giorni, impongono il mantenimento di una copertura antiperonosporica efficace e duratura.

Si consiglia pertanto di intervenire **entro domenica 7 giugno** impiegando una miscela antiperonosporica a base di

Metalaxil-M + Folpet opp. **Dithianon**

oppure

Oxathiapiprolin + Zoxamide

Si raccomanda di passare in tutti i filari utilizzando le dosi per ettaro

Nei vigneti in cui alla pioggia si è accompagnata la **grandine**, prediligere i formulati contenenti la sostanza attiva Folpet.

OIDIO

Trattare

Già nella fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli in formazione. Si consiglia pertanto di miscelare all'antiperonosporico un antioidico dotato di sistemica (I.B.E.). Un'altra efficace alternativa nella difesa antioidica ai prodotti di sintesi è costituita dallo **Zolfo in Polvere**

FLAVESCENZA DORATA

Non trattare

Non si sono ancora realizzate le condizioni di sviluppo dell'insetto vettore della malattia affinché il trattamento possa definirsi efficace.

NON SI DEVE ASSOLUTAMENTE INTERVENIRE

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617