

DIFESA INTEGRATA DELLA VITE

Applicazione Regolamento CE 1305/2013
COMITATO DI COORDINAMENTO FITOSANITARIO
Corso IV novembre, 44 – 15100 Alessandria - Tel. 0131 52086

ZONA OPERATIVA MONFERRATO CASALESE

Bollettino di difesa della vite n° 2 del 23.04.2025

Fase fenologica prevalente: **Da Germogliamento a Grappoli visibili**

PERONOSPORA

Valutare

In questo momento la vegetazione presenta uno sviluppo molto difforme e, a vigneti in cui il germogliamento è nella fase iniziale si alternano vigneti, per esempio quelli di Nebbiolo, in cui la vegetazione supera ormai i 30 cm. di lunghezza. In tutti i vigneti nei quali la vegetazione abbia già superato i 10 cm. di lunghezza, **si raccomanda di intervenire non appena possibile**, con un trattamento a base di **Iprovalicarb + Folpet**

Si ricorda che i trattamenti di inizio stagione, soprattutto in annate piovose che seguono annate in cui la malattia è stata ovunque diffusa e aggressiva, sono essenziali per poter garantire nel prosieguo dell'annata la sanità dei grappoli.

OIDIO

Trattare

La difesa della vite dal mal bianco è efficace solo se si agisce con strategie preventive. Già nella fase iniziale della stagione l'oidio può colonizzare foglie, tralci e grappoli, in formazione. Si consiglia pertanto di miscelare all'antiperonosporico un antioidico a base di **Meptyldinocap**.
È possibile in alternativa impiegare **Zolfo in Polvere**.

VIETATA LA DIFFUSIONE DEL CONTENUTO NEI COMUNI NON CONVENZIONATI

Coldiretti Casale M.to 0142 452840 - Coldiretti Cerrina 0142 943800
Confagricoltura Alessandria 0142 452209
Confederazione Italiana Agricoltori 0142 454617