



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 01
04/03/2022

PESCO **(BOTTONI ROSA)**

BOLLA

SIAMO IN FASE DI RIPRESA VEGETATIVA AVANZATA PER CHI NON AVESSE ANCORA EFFETTUATO TRATTAMENTI, SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX UN INTERVENTO ALL'ANNO)

OPPURE

CAPTANO (VARI) ,

SI RICORDA CHE I FORMULATI INDICATI HANNO EFFICACIA ANCHE CONTRO CORINEO

ALBICOCCO **(PRE-FIORITURA)**

MONILIA

SI RICORDA CHE E' ANCORA POSSIBILE UTILIZZARE PRODOTTI A BASE DI:

CYPRODINIL+FLUDIOXONIL (SWITCH A 0,3 KG/HA)

OPPURE

CYPRODINIL (CHORUS)

(MASSIMO DUE INTERVENTI ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

OPPURE

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR)(AL MASSIMO DUE INTERVENTI)

(I FUNGICIDI IBE NON SONO IMPIEGABILI PIÙ DI TRE VOLTE ALL'ANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

. PESCO (BOTTONI ROSA)

ANARSIA-TRIPIDE FIORALE-AFIDI

NELLE ZONE A RISCHIO, PER ATTACCHI NEGLI ANNI PRECEDENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

TAU-FLUVALINATE (KLARTAN 20 EW, MAVRIK 20 EW, ETC..).
AL MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO IN PRE-FIORITURA.
(AZIONE COLLATERALE ANCHE SU AFIDI)

AFIDE VERDE

INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:
FLONICAMID (TEPPEKI)(MAX 1 INT/ANNO)
ACETAMIPRID (EPIK)

SUSINO-CILIEGIO (BOTTONI FIORALI-GEMMA GONFIA)

CORINEO

VISTA LA FASE FENOLOGICA AVANZATA, PER CHI NON AVESSE ANCORA FATTO INTERVENTI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI: SUSINO (ENTRO LA FIORITURA):

ZIRAM(VARI)(MASSIMO 3 KG/HA, MAX 1 INTERVENTO ALL'ANNO)
CAPTANO (VARI) , (MAX 2 INTERVENTI/ANNO TRA ZIRAM E CAPTANO)

MELO/PERO (ROTTURA GEMME/GEMME GONFIE)

CANCRI RAMEALI

IN QUESTA FASE FENOLOGICA È ANCORA POSSIBILE EFFETTUARE UN TRATTAMENTO SPECIFICO CON PRODOTTI A BASE DI:

RAME (VARI) (LIMITE DI 6 KG/HA SI S.A. ALL'ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (ROTTURA GEMME)

ANTONOMO

NEGLI IMPIANTI A RISCHIO (ZONE COLLINARI VICINO AI BOSCHI), SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE I MONITORAGGI ED EVENTUALMENTE INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FOSMET (SPADA WDG, ETC..) (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

COCCINIGLIA/AFIDE LANIGERO

IN SITUAZIONI A RISCHIO, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE ENTRO LA FASE DI GEMMA INGROSSATA CON PRODOTTI A BASE DI.

OLIO MINERALE + ZOLFO (POLITHIOL: SI RACCOMANDA DI EFFETTUARE IL TRATTAMENTO IN ASSENZA DI VEGETAZIONE)

OPPURE

OLIO MINERALE (VARI)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

