



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 06

09/06/2021

PESCO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA MOLESTA

I DATI DEI MONITORAGGI E DEI MODELLI PREVISIONALI DICONO CHE SIAMO NELLA FASE INIZIALE DEL SECONDO VOLO: SI CONSIGLIA PERTANTO DI INTERVENIRE PROSSIMAMENTE CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

(PRODOTTI ATTIVI ANCHE CONTRO ANARSIA)

OIDIO

VISTO L'ELEVATO RISCHIO D'INFEZIONE, SI CONSIGLIA DI MANTENERE LA COPERTURA CON UN PRODOTTO SPECIFICO A BASE DI:

BUPIRIMATE (NIMROD) T.C. 14 GG

OPPURE

ZOLFO BAGNABILE (VARI) T.C. 5 GG

OPPURE

PROPICONAZOLO* (VARI) T.C. 14 GG (AL MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO;

OPPURE

FENBUCONAZOLO* (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

*(CON IBE AL MASSIMO 4 INT/ANNO)

IN CASO DI INFEZIONI IN ATTO SI CONSIGLIA DI ASPORTARE I GETTI COLPITI

*SI RICORDA CHE I P.A. HANNO AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA BOLLA DEL PESCO E MONILIA





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SIAMO NELLA FASE FINALE DELLA I GENERAZIONE PER CUI SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DI INTERVENTO DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CARPOCAPSA

I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO LA FASE AVANZATA DELLA PRIMA GENERAZIONE: SOLAMENTE IN PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **LARVICIDA** A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO)

OPPURE

FOSMET (SPADA) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OPPURE

ETOFENPROX (TREBON, SWORD UP) (MASSIMO DUE INT./ANNO)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

AFIDI

SI SEGNA LA PRESENZA DI ATTACCHI (AFIDE LANIGERO/GRIGIO): SI CONSIGLIA COMUNQUE DI CONTATTARE I TECNICI PRIMA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

SULFOXAFLOX (CLOSER) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

FLONICAMID (TEPPEKI) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

TICCHIOLATURA

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE A SCOPO CAUTELATIVO CON INTERVENTI DI COPERTURA SOLO IN PREVISIONE DI PIOGGIA.





Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

CILIEGIO-ALBICOCCO (INGROSSAMENTO FRUTTI-INVAIATURA) MONILIA

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI COMUNICA CHE È STATA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER L'IMPIEGO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO **EXIREL** CONTENENTE LA SOSTANZA ATTIVA *CYANTRANILIPROLE* PER LA DIFESA DAL MOSCERINO PER 120 GG A FAR DATA DAL 13 MAGGIO (MASSIMO DUE INTERVENTI)

N.B. Le informazioni contenute nel presente bollettino si intendono fornite a titolo indicativo. L'applicazione dei vari prodotti deve rispettare quanto stabilito dall'etichetta ministeriale e, se aderenti all'operazione 10.11, ai DISCIPLINARI REGIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

