



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 05
23/05/2022

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI)**

VISTE LE CONDIZIONI CLIMATICHE E LA FASE FENOLOGICA SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

NEI FRUTTETI A RISCHIO DI INFEZIONE E SU VARIETÀ SENSIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI ANTIODICI SPECIFICI A BASE DI:

ZOLFO
BUPIRIMATE (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CILIEGIO-ALBICOCCO **(INVAIATURA-MATURAZIONE)**

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 5 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA





Coldiretti Alessandria



CILIEGIO (INVAIATURA)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN **FASE DI INVAIATURA** (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

FOSMET* (SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

* EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII*

OPPURE

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C. 7 GG

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITA'.

DROSOPHILA SUZUKII

PER INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) T.C. 14 GG (2 INT./ANNO)

DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT/ANNO)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

VISTE LE PREVISIONI DI PIOGGIA, SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 12 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

FLUOPYRAN+TEBUCONAZOLO (LUNA EXPERIENCE) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')(ATTIVO ANCHE PER OIDIO)

PENTHIOPYRAD (FONTELIS) (MASSIMO 2 TRATT/INDIPENDENTEMENTE DALL'AVVERSITA')

PER INTERVENTI SUCCESSIVI AGGIUNGERE UN PRODOTTO RETROATTIVO A BASE DI:

IBE (MASSIMO 4 INTERVENTI)

(FENBUCONAZOLO,TEBUCONAZOLO,DIFENOCONAZOLO,PENCONAZOLO TETRACONAZOLO)

CARPOCAPSA

I DATI DEI MONITORAGGI CONFERMANO CHE SIAMO NELLA FASE DI PIENO VOLO DELLA PRIMA GENERAZIONE DELL'INSETTO: SI CONSIGLIA DI TRATTARE CON PRODOTTI AD AZIONE **OVO-LARVICIDA** A BASE DI:

METOSSIFENOZIDE (INTREPID) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OPPURE

CLORANTRANILIPROLE (CORAGEN) (MASSIMO 2 INTERVENTI)

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTIOIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)





Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (FINE FIORITURA) AFIDE LANIGERO

IN CASO DI PRESENZA DI ATTACCHI VISIBILI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

SULFOXAFLOL (*CLOSER*) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

OPPURE

PIRIMICARB (*PIRIMOR 50* ETC) AL MASSIMO UN INTERVENTI/ANNO

OPPURE

ACETAMIPRID (*EPIK*) AL MASSIMO DUE INTERVENTI/ANNO

OPPURE

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.

