




Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

COORDINAMENTO TECNICO VOLPEDO FRUTTA

BOLLETTINO N° 08
22/06/2022

PESCO **(INGROSSAMENTO FRUTTI-MATURAZIONE)**

CYDIA MOLESTA

DA MONITORAGGI E MODELLI PREVISIONALI PROSEGUE LA FASE LARVALE DELLA SECONDA GENERAZIONE: SE NON SONO ANCORA STATI EFFETTUATI INTERVENTI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA (ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA) A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INT./ANNO) T.C. 14 GG

INDOXACARB (STEWART) (MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C. 7GG

FOSMET (SPADA) (2 INT./ANNO) T.C. 10 GG

SPINETORAM (DELEGATE WDG) (MASSIMO UN INT./ANNO) T.C 7 GG

ETOFENPROX (TREBON-SWORD UP)(MASSIMO 2 INT./ANNO) T.C 7 GG


SPINOSAD (LASER) T.C. 7GG.

BACILLUS THURINGENSIS (VARI)

*SI RICORDA CHE I P.A. HANNO AZIONE COLLATERALE ANCHE CONTRO LA MONILIA



Coldiretti Alessandria



Confagricoltura
Alessandria



CIA Alessandria

PESCO

(INGROSSAMENTO FRUTTI - MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ IN FASE DI MATURAZIONE, SI CONSIGLIA DI PROGRAMMARE GLI INTERVENTI IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA, CON PRODOTTI A BASE DI:

- **FENBUCONAZOLO** (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 3 GG)
- **TEBUCONAZOLO** (FOLICUR) T.C.7 GG. (MASSIMO 2INT/ANNO)
(CON IBE MASSIMO 4 INTERVENTI)

OPPURE

- **FENEXAMIDE** (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- **BOSCALID** (CANTUS) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)
- **PENTHIOPYRAD** (FONTELIS)T.C.3 GG. (MASSIMO 1 INTERVENTO/ANNO)
- **TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO** T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

CILIEGIO-ALBICOCCO

(MATURAZIONE)

MONILIA

PER LE VARIETÀ PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

FENBUCONAZOLO (SIMITAR EVO, INDAR, T.C. 5 GG)

OPPURE

TEBUCONAZOLO (FOLICUR) T.C.7 GG.(MASSIMO 2INT/ANNO)

OPPURE

(CON IBE MASSIMO 3 INT./ANNO)

OPPURE

FENEXAMIDE (TELDOR) T.C.3 GG. (MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

OPPURE

TRYFLOXISTROBIN+TEBUCONAZOLO T.C. 7 GG. (FLINT MAX)
(MASSIMO 2 INTERVENTI/ANNO)

PRESTARE ATTENZIONE AI TEMPI DI CARENZA



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

SUSINO (INGROSSAMENTO FRUTTI)

CYDIA FUNEBRANA

SIAMO NELLA FASE DI OVIDEPOSIZIONE ED È INIZIATA LA NASCITA DELLE LARVE: È POSSIBILE INTERVENIRE SUBITO CON PRODOTTI AD AZIONE OVO-LARVICIDA:

CLOTRANILIPROLE (CORAGEN) T.C. 14 GG (MASSIMO 2 INT.)

IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI TRATTARE A PARTIRE DALLA PROSSIMA SETTIMANA CON PRODOTTI AD AZIONE LARVICIDA A BASE DI:

EMAMECTINA BENZOATO (AFFIRM) (2 INTERV./ANNO) T.C. 7 GG.

FOSMET (SPADA) (DUE INT./ANNO) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID (KESTREL) (DUE INT./ANNO) T.C. 15 GG

CILIEGIO (MATURAZIONE)

MOSCA DEL CILIEGIO

SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE IN FASE DI INVAIATURA (IN FUNZIONE DEI TEMPI DI CARENZA) CON PRODOTTI A BASE DI:

ETOFENPROX* (TREBON, SWORD UP) T.C. 7 GG.

FOSMET *(SPADA 200 EC) T.C. 14 GG.

ACETAMIPRID* (EPIK) T.C. 14 GG

** EFFICACI ANCHE CONTRO *DROSOPHILA SUZUKII**

OPPURE

SPINOSAD (SPINTOR FLY): TALE FORMULATO VA UTILIZZATO CON TRATTAMENTI LOCALIZZATI (ESCA) T.C. 7 GG

SI RICORDA CHE E' AMMESSO UN SOLO TRATTAMENTO A TUTTA CHIOMA CONTRO TALE AVVERSITÀ.

DROSOPHILA SUZUKII

PER INTERVENTI SPECIFICI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON PRODOTTI A BASE DI:

ACETAMIPRID (EPIK) T.C. 14 GG (2 INT./ANNO)

DELTAMETRINA (DECIS EVO ETC) T.C. 7 GG GG (CON PIRETROIDI MASSIMO 2 INT./ANNO)

SPINETORAM (DELEGATE WDG) T.C. 7 GG (MASSIMO 2 INT/ANNO)



Coldiretti Alessandria



CIA Alessandria

MELO (INGROSSAMENTO FRUTTI) TICCHIOLATURA

IN PREVISIONE DI POSSIBILI PIOGGE, SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA CON PRODOTTI A BASE DI:

FLUAZINAM (NANDO MAXI, ETC..)

DITHIANON (DELAN 70WG, ETC.)

(AL MASSIMO 1 4 TRATTAMENTI TRA DITHIANON E CAPTANO)

ZOLFO (THIOPRON, ETC..)

CARPOCAPSA

SI CONSIGLIA DI ATTENDERE LE INDICAZIONI DEI PROSSIMI BOLLETTINI.

OIDIO

NEI MELETI A RISCHIO ED IN PRESENZA DI INFEZIONI, SI CONSIGLIA DI INTERVENIRE CON UN PRODOTTO ANTI-OIDICO SPECIFICO A BASE DI:

ZOLFO (VARI)

BUPIRIMATE (NIMROD)

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE BOLLETTINO SI INTENDONO FORNITE A TITOLO INDICATIVO. NELL'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITÀ E LE AVVERTENZE RIPORTATE IN ETICHETTA.

In considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di classificazione dei prodotti fitosanitari, viene sospeso per due anni il vincolo che prevede che quando della s.a. esistano diversi formulati commerciali occorre dare preferenza a quello con la migliore classificazione tossicologica.